

THÔNG BÁO
Phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi

Kính gửi: Các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi heo.

Đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra ở phạm vi rộng trên phạm vi cả nước và đang có chiều hướng gia tăng mạnh, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi-rút gây ra, có khả năng lây lan nhanh, tỉ lệ chết cao (lên đến 100%), chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi và ngành chăn nuôi heo của địa phương.

1. Tính nguy hiểm của bệnh Dịch tả heo Châu Phi

Heo mắc bệnh thường có triệu chứng: sốt cao, bỏ ăn, da xuất huyết (đặc biệt vùng tai, bụng, chân), heo khó thở, nằm tụ tập một chỗ. Tỉ lệ chết rất cao và nhanh gây thiệt hại lớn. Vi-rút có sức đề kháng cao ngoài môi trường, tồn tại lâu trong thịt, sản phẩm từ thịt heo.

2. Lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng bệnh

Giúp đàn heo có miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong. Giảm thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Góp phần ổn định phát triển chăn nuôi heo bền vững. Hạn chế lây lan dịch bệnh ra diện rộng.

3. Sử dụng vắc xin phòng Dịch tả heo Châu Phi

- Đối tượng tiêm: Heo từ 4-8 tuần tuổi, khỏe mạnh, không có dấu hiệu mắc bệnh.
- Liều lượng và cách tiêm: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Lưu ý: Trước và sau khi tiêm cần đảm bảo heo được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, bổ sung dinh dưỡng và khoáng chất.

4. Biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học

- Kiểm soát chặt chẽ người và động vật ra vào khu vực chăn nuôi; chuồng nuôi có lưới bao xung quanh chuồng nuôi và biện pháp khác ngăn chặn côn trùng và vật chủ trung gian truyền bệnh (chuột, chim, ruồi, muỗi...).
- Tại lối ra vào chuồng nuôi phải bố trí hố khử trùng, thay bảo hộ lao động cho người ra, vào khu vực chăn nuôi.
- Heo nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, không mua heo qua mạng, heo bán dạo. Đối với heo giống nhập từ tỉnh khác phải có giấy chứng nhận kiểm dịch. Heo mới mua về nên nuôi cách ly ít nhất 2 tuần trước khi nhập đàn.

- Áp dụng phương thức quản lý đàn heo "cùng vào-cùng ra" theo thứ tự ưu tiên: cùng một dãy chuồng, một ô chuồng.

- Bổ sung chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng khả năng tiêu hóa, sức đề kháng cho heo. Không sử dụng thức ăn thừa trong máng ăn của đàn heo đã xuất chuồng và thức ăn của đàn heo đã bị dịch bệnh cho đàn heo mới.

- Nước sử dụng trong chăn nuôi phải an toàn; định kỳ bổ sung vitamin C vào nước uống cho heo.

- Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tuần; phun thuốc sát trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần.

- Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa heo mới vào nuôi. Các phương tiện vận chuyển trước và sau khi vào chuồng nuôi phải được vệ sinh, khử trùng, không để phương tiện vận chuyển của thương lái, phương tiện vận chuyển thức ăn chăn nuôi đến khu vực nuôi heo.

5. Khuyến cáo

Người chăn nuôi cần nghiêm túc thực hiện việc tiêm phòng vắc xin và các biện pháp an toàn sinh học theo hướng dẫn. Chỉ khi tiêm phòng đầy đủ, chủ động phòng bệnh mới có thể bảo vệ được đàn heo và giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Khi phát hiện bệnh DTHCP, không được giấu dịch phải thông báo cho nhân viên thú y xã, chính quyền nơi gần nhất.

Phòng Kinh tế xã Nhị Trường đề nghị các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt.

Nơi nhận:

- PCT Lê Văn Phi;
- Trang Thông tin điện tử;
- Đài Truyền thanh;
- Trưởng Ban nhân dân các ấp;
- Lưu: VT.

