

THÔNG BÁO
Các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay cả nước đã xuất hiện trên 514 ổ dịch Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) tại 28/34 tỉnh, thành phố. Số heo mắc, chết và tiêu hủy trên 30.000 con. Nguy cơ dịch bệnh DTLCP có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi heo, nguồn cung thực phẩm và môi trường.

Để công tác phòng chống bệnh tốt hơn, Phòng Kinh tế thông báo triệu chứng và các biện pháp phòng chống bệnh DTHCP như sau:

1. Triệu chứng bệnh DTHCP

Thời gian ủ bệnh từ 4-19 ngày, ở thể cấp tính thời gian ủ bệnh chỉ khoảng 3-4 ngày. Heo bị bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh cụ thể:

- Thể quá cấp tính (do vi rút có độc lực cao gây ra): Heo bị chết nhanh mà không có triệu chứng bệnh.

- Thể cấp tính (do vi rút có độc lực cao gây ra): Heo sốt 40,5-42⁰C, ít vận động ủ rũ, heo thích nằm chỗ mát hoặc gần nước. Heo có biểu hiện đau bụng, lưng cong,; da vành tai, đuôi, cẳng chân, ngực và bụng, có thể có màu tím sẫm. Đi không vững, thở gấp, thở khó, có lẫn máu ở mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón, phân cứng có kích thước nhỏ, có chất nhầy và máu. Heo mang thai có thể sảy thai ở mọi giai đoạn. tỷ lệ chết lên đến 100%.

- Thể á cấp tính (do vi rút có độc tính trung bình gây ra): Heo sốt nhẹ hoặc sốt lúc tăng lúc giảm, giảm ăn, sụt cân, ủ rũ, khó thở, ho có đờm, viêm khớp, vận động khó khăn; heo mang thai sẽ sảy thai, heo có thể bị chết trong vòng 15-45 ngày, tỷ lệ chết từ 30-70%.

- Thể mãn tính (do vi rút có độc tính trung bình hoặc thấp gây ra): Heo bị giảm cân, sốt, có triệu chứng hô hấp, hoại tử da, viêm loét da mạn tính, viêm khớp, có tỷ lệ chết thấp.

3. Các biện pháp phòng chống bệnh DTHCP

Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi heo và tiêm phòng vaccine DTHCP là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, trong đó người chăn nuôi heo cần thực hiện:

a) Đối với chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi heo

- Kiểm soát chặt chẽ người và động vật ra vào khu vực chăn nuôi; chuồng nuôi có lưới bao xung quanh chuồng nuôi và biện pháp khác ngăn chặn côn trùng và vật chủ trung gian truyền bệnh (chuột, chim, ruồi, muỗi...).

- Tại lối ra vào chuồng nuôi phải bố trí hố khử trùng, thay bảo hộ lao động cho người ra, vào khu vực chăn nuôi.

- Nên có ô chuồng nuôi cách ly để nuôi heo mới nhập.

- Có khu vực thu gom và xử lý chất thải

- Không sử dụng chung dụng cụ chăn nuôi giữa các dãy chuồng.

b) Đối với heo giống

Heo được nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh từ những cơ sở đã tiêm phòng vacinne DTHCP, Lở mồm long móng, dịch tả cổ điển...; không mua heo qua mạng internet. Đối với heo giống nhập từ tỉnh khác phải có giấy chứng nhận kiểm dịch. Heo mới mua về nên nuôi cách ly ít nhất 2 tuần Trước khi nhập đàn.

c) Chăm sóc nuôi dưỡng heo

- Áp dụng phương thức quản lý đàn heo "cùng vào-cùng ra" theo thứ tự ưu tiên: cùng một dãy chuồng, một ô chuồng.

Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Nên bổ sung chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng khả năng tiêu hóa, sức đề kháng cho heo. Không sử dụng thức ăn thừa trong máng ăn của đàn heo đã xuất chuồng và thức ăn của đàn heo đã bị dịch bệnh cho đàn heo mới.

Nước sử dụng trong chăn nuôi phải an toàn; định kỳ bổ sung vitamin C vào nước uống cho heo.

Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.

d) Vệ sinh, tiêu độc và kiểm soát người ngoài ra, vào khu vực chuồng nuôi

Hạn chế tối đa người ngoài ra, vào khu vực chuồng nuôi. Trước và sau khi vào, ra khu chăn nuôi phải thay bảo hộ lao động, sát trùng tay, nhúng ủng hoặc giày, dép vào hố khử trùng. Bổ sung hoặc thay hàng ngày thuốc sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào khu chăn nuôi, chuồng nuôi.

Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tuần; phun thuốc sát trùng trong chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần. Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất 2 lần/tháng. Vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày dụng cụ và phương tiện chăn nuôi phải được tiêu độc khử trùng thường xuyên.

Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa heo mới vào nuôi. Các phương tiện vận chuyển trước và sau khi vào chuồng nuôi phải được vệ sinh, khử trùng, không để phương tiện vận chuyển của thương lái, phương tiện vận chuyển thức ăn chăn nuôi đến khu vực nuôi heo.

e) Phòng chống dịch bệnh

Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho heo theo quy định của cơ quan thú y: bệnh Dịch tả heo Châu Phi, Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, dịch tả cổ điển...

** Lưu ý: Khi phát hiện bệnh DTHCP, không được giấu dịch phải thông báo cho nhân viên thú y xã, chính quyền nơi gần nhất. Không điều trị heo bệnh, nghi mắc bệnh DTHCP.*

Nơi nhận:

- PCT Lê Văn Phi;
- Trang Thông tin điện tử;
- Đài Truyền thanh;
- Trưởng Ban nhân dân các ấp;
- Lưu: VT.

